

Противоэпидемические мероприятия в очагах ветряной оспы

Ветряная оспа – это острое вирусное инфекционное заболевание, характеризующееся поражением кожи и слизистых оболочек в виде полиморфной макуло-папулезно-везикулезной сыпи, умеренно выраженной лихорадкой и симптомами общей интоксикации. Возбудитель ветряной оспы - вирус *Varicella Zoster virus* неустойчивый во внешней среде, но длительно сохраняется при низких температурах. Источником инфекции является больной человек.

Инкубационный период при ветряной оспе составляет от 10 до 21 календарного дня (в среднем 13-17 календарных дней).

Противоэпидемические мероприятия в очагах ветряной оспы (2 и более случаев в одном коллективе):

- своевременное выявление больных ветряной оспой, а также случаев заболеваний, подозрительных на эту инфекцию;
- выявление круга контактных лиц;
- выявление лиц, не болевших и не привитых против ветряной оспы, для проведения экстренной профилактики;
- активная иммунизация против ветряной оспы проводится детям (в возрасте от 12 месяцев) и взрослым, не имеющим медицинских противопоказаний к введению вакцины, **в первые 72 - 96 часов** после вероятного контакта с больным ветряной оспой;
- при наличии среди контактных лиц, не болевших ветряной оспой, не привитых и (или) не получивших завершённый курс вакцинации против ветряной оспы, за ними устанавливается медицинское наблюдение **сроком на 21 календарный день** с момента изоляции последнего заболевшего;
- с целью активного выявления больных ежедневно необходимо проводить осмотры детей (оценка общего состояния, осмотр кожных покровов, измерение температуры тела), контактировавших с источником возбудителя ветряной оспы, с фиксацией результатов в медицинской документации;
- прекращается прием новых и временно отсутствовавших детей, не болевших ветряной оспой и не привитых против этой инфекции в группу (коллектив), где зарегистрирован случай заболевания ветряной оспой;
- запрещается участие в массовых мероприятиях детей из группы (коллектива), в котором выявлены случаи заболеваний, а также перевод детей такой группы в другие группы (коллективы);
- дважды в день организуется и проводится влажная уборка помещений с применением моющих и (или) дезинфицирующих средств;
- из обихода исключаются мягкие игрушки, игрушки из других материалов ежедневно в конце дня моются горячей водой с моющим средством;
- проводится дезинфекция воздушной среды с использованием ультрафиолетового облучения или других способов, разрешенных для этих целей, не менее четырех раз в день проводится проветривание (по 8-10 минут);
- допуск реконвалесцента ветряной оспы в коллектив разрешается после его клинического выздоровления, но **не ранее шестого дня** со времени появления последнего свежего элемента сыпи независимо от наличия вторичных случаев ветряной оспы в очаге и **только при наличии справки об отсутствии медицинских противопоказаний** для посещения организаций, осуществляющих образовательную деятельность и иных организаций.